


วิพากษ์สวนปาล์มทุ่งรังสิต

อุตุนิยมวิทยาได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสวนปาล์มในพื้นที่ทุ่งรังสิต และได้ร่วมเสวนากับเกษตรกรในพื้นที่ที่บ้านคุณอักษร น้อยสว่าง ประธานชมรมผู้ปลูกปาล์มทุ่งรังสิต มีบทสรุปและข้อเสนอแนะดังนี้

1. พื้นที่ทุ่งรังสิตมีความเหมาะสมที่จะปลูกปาล์มน้ำมัน แม้ดินจะเปรี้ยว แต่เมื่อมีการปรับค่าpHของผิวดินด้วยปูนมาร์ล หรือปูนโดโลไมท์ ประกอบกับการที่น้ำในคลองชลประทานมีค่าความเป็นด่างค่อนข้างสูง และมีปริมาณมากสามารถใช้รดน้ำได้ทั้งปี จึงทำให้สามารถปรับค่าpHของหน้าดินมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับต้นปาล์มน้ำมันได้
2. การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ทุ่งรังสิต ส่วนใหญ่จะปลูกบนร่องสวนส้มเก่า ซึ่งเมื่อต้นปาล์มมีอายุเกิน8ปีขึ้นไป อาจทำให้เลี้ยงที่ต้นจะล้มได้ง่าย เพราะรากฝอยของต้นปาล์มไม่สามารถขยายแผ่ไปได้ในบริเวณกว้างและลึกเพียงพอ จึงขอแนะนำให้เกษตรกรลดระดับน้ำระหว่างร่องสวนให้ต่ำกว่าร่องดินปลูกประมาณ 70-100 เซนติเมตร และให้เก็บน้ำไว้ตามร่องรอบพื้นที่แทน โดยขุดร่องรอบพื้นที่ให้ลึกและกว้างมากขึ้น ดังในรูปข้างล่าง



(หมายเหตุ การกลบร่องน้ำระหว่างร่องดินปลูกแบบกลบร่อง เว้นร่อง จะช่วยให้มีพื้นที่สำหรับรากปาล์มจับยึดมากขึ้น)

3. จากการสังเกตผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ลานรับซื้อปาล์มน้ำมัน พบว่าผลปาล์มติดลูกไม่เต็มทะลาย ซึ่งน่าจะเกิดจากพื้นที่ที่หลายแปลงขาดตัวผสมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เกษตรกรจึงควรหาดังกล่าวมาเพิ่มในพื้นที่สวนให้มากขึ้น
4. เนื่องจากพื้นที่เป็นดินเปรี้ยว เกษตรกรควรใช้ปุ๋ยยูเรียแทนปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) เกษตรกรต้องรดน้ำให้ปุ๋ยยูเรียละลายหมดทันทีหลังจากใส่ปุ๋ยยูเรีย เพื่อลดการระเหิดหรือระเหยตัวของปุ๋ย
5. จากการสำรวจพื้นที่ พบว่าเกษตรกรไม่มีการคัดต้นทิ้งหลังการปลูกลงดินในช่วง 3 ปีแรก เช่นต้นปาล์มที่เป็นโรคยอดเน่า ทางใบบิด ทรงต้นผิดแปลกจากต้นอื่น เช่นทางใบยาว ทางใบแข็งตรงกว่า ใบย่อยเล็กกว่า เป็นต้น ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดน้อยลง เพราะปาล์มน้ำมันผิดปกติดังกล่าวให้ผลผลิตที่ต่ำ
6. นอกจากนี้ยังพบว่าหลายแปลงในทุ่งรังสิต โดยเฉพาะที่เพิ่งปลูกใหม่ในช่วง 2 – 3 ปี ปลูกต้นกล้าที่เป็นโรคยอดเน่า ทางใบบิดในปริมาณที่ผิดปกติสูงกว่าร้อยละยี่สิบหรือบางแปลงอาจถึงร้อยละ 50 เกษตรกรควรร้องเรียนจากผู้จำหน่าย เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคทางพันธุกรรมที่จะเป็นๆหายๆตลอดอายุของต้นปาล์มน้ำมัน มีผลทำให้ต้นโตช้าและให้ผลผลิตน้อยลง ในมาตรฐานพันธุ์ปาล์มน้ำมันของประเทศไทยกำหนดให้มีต้นปาล์มที่เป็นโรคยอดเน่า ทางใบบิดได้ไม่เกินร้อยละ 5

